

заказ №: **81127/6**
размер: **148x105 (152x109) мм**
цветность: **СМУК/СМУК**
верстка: **Шваб**

sitall
полиграфическая компания

27.11.2013

Нарицына

дата:

менеджер:



Обложка, лицевая сторона



Обложка, внутренняя сторона

Prepress/Users/ВЕРСТКА/SHVAB/_В РАБОТЕ/81127/6 Мальчику/Обложка.ai

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подписывая оригинал-макет, Вы подтверждаете, что вся текстовая информация соответствует требуемой в полном объеме; геометрические размеры, количество красок соответствуют требуемым. Вся ответственность за правильность информации на оригинал-макете после его подписания лежит на Заказчике. Любые исправления, дополнения на утвержденном оригинал-макете влекут за собой увеличение сроков отгрузки и дополнительные расходы. Цветовым эталоном может являться только отпечатанный промышленным способом образец.

ЭТО ВАЖНО!

Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение в сыворотке крови антител к ВИЧ, которые вырабатываются иммунной системой организма в ответ на внедрение вируса. Они появляются у 90-95 % инфицированных в течение 3-х месяцев после заражения. Поэтому первый анализ на ВИЧ врачи советуют делать через 3 - 4 недели после возможного заражения.

При отрицательном результате обследоваться повторно через 3 и 6 месяцев.

В учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно, в условиях строгой конфиденциальности.

Большинство инфекций, передающихся половым путем, поддаются лечению. Но нельзя забывать о том, что ВИЧ-инфекция, которая до сих пор является неизлечимым заболеванием, продолжает активно распространяться в молодежной среде. Ежегодно в России около 8 человек узнают о том, что заражены ВИЧ-инфекцией. Вдумайся в эти цифры. При этом многие почему-то считают, что лично их ВИЧ-инфекция не коснется. Или верят, что ВИЧ - «это судьба», от которой невозможно застраховаться! Некоторые думают, что «это от меня не так уж сильно зависит» или «я стараюсь об этом не думать», «у меня постоянный партнер - меня это не волнует»... На самом деле ВИЧ-инфекция, как и многие другие инфекции,

в блоке стр. 16

в блоке стр. 1

передающиеся половым путем - такая же болезнь, как и все остальные. Любой человек может оказаться в зоне риска. Способы заражения ВИЧ прекрасно известны, поэтому каждый может защитить своё здоровье, соблюдая простые правила профилактики.

Что такое ВИЧ-инфекция?

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, вызывающий ВИЧ-инфекцию.

ВИЧ-инфекция - инфекционное заболевание, которое воздействует на иммунную систему человека, подавляя ее активность, в результате чего любая другая инфекция может привести к тяжелому заболеванию и даже летальному исходу. Конечной стадией ВИЧ-инфекции является **СПИД**.

СПИД- Синдром (совокупность признаков) Приобретенного (возникшего в результате заражения ВИЧ) Иммунодефицита (недостаточность защитных сил организма).

Единственный источник ВИЧ-инфекции - человек, зараженный ВИЧ.

Среди нас живет много людей, зараженных ВИЧ. Некоторые знают о своей болезни, но многие даже не подозревают о ней. Вирус может находиться в организме человека 10 лет и больше, прежде чем появятся первые симптомы болезни. В это время он активно размножается за счет основных клеток иммунной системы - лимфоцитов. Передавать инфекцию другому человеку ВИЧ-инфицированный может уже через несколько дней после заражения.

в блоке стр. 2

в блоке стр. 3

Prepress/Users /ВЕРСТКА/SHVAB/_В РАБОТЕ/81127/6 Мальчику/блок.ai

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подписывая оригинал-макет, Вы подтверждаете, что вся текстовая информация соответствует требуемой в полном объеме; геометрические размеры, количество красок соответствуют требуемым. Вся ответственность за правильность информации на оригинал-макете после его подписания лежит на Заказчике. Любые исправления, дополнения на утвержденном оригинал-макете влекут за собой увеличение сроков отгрузки и дополнительные расходы. Цветовым эталоном может являться только отпечатанный промышленным способом образец.

<p>Что надо знать о передаче ВИЧ?</p> <p>ВИЧ может находиться практически во всех биологических жидкостях организма, но опасны для заражения только следующие:</p> <ul style="list-style-type: none">• Кровь• Сперма• Вагинальный секрет• Грудное молоко <p>В других жидкостях организма вирус тоже есть, но его концентрация слишком мала для передачи вируса. Безопасные в отношении заражения ВИЧ-инфекцией жидкости:</p> <ul style="list-style-type: none">• Моча• Слюна• Пот <p>В быту ВИЧ-инфицированный человек не опасен.</p>	<p>Вирус не передается:</p> <ul style="list-style-type: none">• При объятиях и дружеских поцелуях, • При кашле и чихании, • При укусах насекомых и животных, • При пользовании общей посудой, • Во время принятия пищи,• При коллективных занятиях спортом,• Через постельное белье или другие личные вещи,• При совместной работе, учебе,• При пользовании общим душем, бассейном, туалетом. 
---	---

в блоке стр. 4

в блоке стр. 5

<p>Как происходит заражение ВИЧ?</p> <p>Заражение ВИЧ-инфекцией связано с определённым поведением. Основной путь распространения ВИЧ-инфекции - половой (заражение возможно даже при единственном половом контакте).</p> <p>По внешнему виду человека нельзя определить, заражен он или нет.</p>	<p>Ещё большей угрозе заражения подвергаются лица, вступающие в случайные половые связи, а также имеющие много половых партнёров. Вирус проникает в здоровый организм через микротравмы, которые возникают на слизистой оболочке при половом контакте.</p> <p>Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти также через кровь при использовании нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков, при использовании инструментов для прокалывания ушей и нанесения татуировки, при переливании зараженной крови, при трансплантации органов и тканей от зараженного человека. Возможно заражение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов, кормления грудью.</p>
--	---


в блоке стр. 6

в блоке стр. 7

Prepress/Users /ВЕРСТКА/SHVAB/_В РАБОТЕ/81127/6 Мальчику/блок.ai

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подписывая оригинал-макет, Вы подтверждаете, что вся текстовая информация соответствует требуемой в полном объеме; геометрические размеры, количество красок соответствуют требуемым. Вся ответственность за правильность информации на оригинал-макете после его подписания лежит на Заказчике. Любые исправления, дополнения на утвержденном оригинал-макете влекут за собой увеличение сроков отгрузки и дополнительные расходы. Цветовым эталоном может являться только отпечатанный промышленным способом образец.




ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ: в твоём возрасте существует много опасностей, связанных с ранними половыми отношениями. Пробуждение полового инстинкта - еще не повод для ранних, а тем более случайных половых связей.

в блоке стр. 8




Мужчине

в блоке стр. 9



Риск заражения ВИЧ-инфекцией для партнеров возрастает при сопутствующих венерических заболеваниях. У мужчин эти заболевания могут протекать бессимптомно, скрыто. При подозрении на венерическое заболевание не стоит заниматься самолечением, так как симптомы многих заболеваний схожи, но лечатся они по-разному. Точный диагноз ставится не только на основании внешнего осмотра, но и обязательно подтверждается с помощью лабораторного исследования (выявление возбудителя болезни).

в блоке стр. 10



Избежать опасности заражения ВИЧ вам помогут несколько советов по снижению сексуального риска:

- Сексуальные контакты с неизвестными партнёрами - очень рискованное занятие.
- Секс с несколькими партнёрами увеличивает риск заражения ВИЧ.
- Даже если у вас один партнёр, следуйте правилам безопасного секса: пользуйтесь презервативами.
- Не употребляйте алкоголь и наркотики! Они снижают критическую оценку, что может послужить причиной вашего рискованного поведения.

в блоке стр. 11

Prepress/Users /ВЕРСТКА/SHVAB/_В РАБОТЕ/81127/6 Мальчику/блок.ai

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подписывая оригинал-макет, Вы подтверждаете, что вся текстовая информация соответствует требуемой в полном объеме; геометрические размеры, количество красок соответствуют требуемым. Вся ответственность за правильность информации на оригинал-макете после его подписания лежит на Заказчике. Любые исправления, дополнения на утвержденном оригинал-макете влекут за собой увеличение сроков отгрузки и дополнительные расходы. Цветовым эталоном может являться только отпечатанный промышленным способом образец.



Если вы точно не знаете, здоров ли ваш партнёр, презерватив является обязательным спутником **при каждом половом контакте**. При этом нужно соблюдать правила использования презерватива:

- На презервативе должна быть указана либо дата окончания срока реализации, либо дата изготовления. Презерватив не следует использовать после истечения срока годности или по истечении пяти лет со дня его изготовления.
- Презервативы следует хранить в прохладном сухом месте вдали от прямого солнечного света.
- Надевать презерватив следует сразу же после возникновения эрекции до начала любого сексуального контакта.
- Зажмите между большими и указательным пальцем кончик презерватива (около 1 см) с целью выпустить оттуда воздух, приложите презерватив к головке полового члена и раскатайте презерватив по всей длине члена, до самого основания.


в блоке стр. 12

в блоке стр. 13

Очень важно оставить на кончике презерватива место для семенной жидкости. Это предотвратит разрыв презерватива в момент семяизвержения.

- Используйте смазку только на водной основе (смазки на масляной основе - вазелин, косметические крема) разрушают резину, губная помада также может повредить презерватив.
- Вывести член из тела партнера необходимо сразу после семяизвержения, пока сохраняется эрекция, при этом нужно придерживать презерватив у основания.
- Никогда не используйте один и тот же презерватив во время секса более чем с одним партнером или при смене вида секса (анального, вагинального, орального).

- Нужно также знать и о том, что хотя презерватив является достаточно надежной защитой против большинства инфекций, передающихся половым путём, все же сифилисом можно заразиться, несмотря на его использование (заразные высыпания могут быть и на тех участках тела, которые презерватив не закрывает, например, в полости рта, и тогда заражение возможно даже при поцелуях). Кроме того, презерватив может соскользнуть или порваться. Поэтому даже при малейшем сомнении не пренебрегайте обследованием.



в блоке стр. 14

в блоке стр. 15

Prepress/Users /ВЕРСТКА/SHVAB/_В РАБОТЕ/81127/6 Мальчику/блок.ai

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подписывая оригинал-макет, Вы подтверждаете, что вся текстовая информация соответствует требуемой в полном объеме; геометрические размеры, количество красок соответствуют требуемым. Вся ответственность за правильность информации на оригинал-макете после его подписания лежит на Заказчике. Любые исправления, дополнения на утвержденном оригинал-макете влекут за собой увеличение сроков отгрузки и дополнительные расходы. Цветовым эталоном может являться только отпечатанный промышленным способом образец.